



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
-الدورة الاستدراكية 2008-
الموضوع

المادة:	الرياضيات	المعامل:	4
الشعب(ة):	مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي	مدة الإنجاز:	2س

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية الغير القابلة للبرمجة

التمرين الأول (2,5 ن)

لتكن f دالة عددية معرفة على المجموعة $D =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ وقابلة للاشتقاق عليه .
الجدول التالي يمثل تغيرات الدالة f .

x	$-\infty$	-3	0	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
		2			-2		

من خلال الجدول .

- | | |
|---|-----|
| 1 . حدد في D حلول المعادلة $f(x) = 0$. | 0,5 |
| 2 . حدد في D حلول المتراجحة $f(x) \leq 0$. | 1 |
| 3 . حدد صورة المجال $]0; 2]$ بالدالة f . | 1 |

التمرين الثاني (4 ن)

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{5u_n + 4}{u_n + 2} ; n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

نضع : $v_n = \frac{u_n - 4}{u_n + 1}$ لكل n من $\mathbb{N}$.


- | | |
|--|-----|
| 1 . أ . بين أن $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{6}$ وحدها الأول $v_0 = -4$. | 1 |
| ب . احسب v_n بدلالة n . | 0,5 |
| 2 . أ . بين أن : $u_n = \frac{4 + v_n}{1 - v_n}$ لكل n من $\mathbb{N}$. | 1 |

- 0,5 ب . استنتج أن : $u_n = \frac{4 \left(1 - \left(\frac{1}{6}\right)^n\right)}{1 + 4 \left(\frac{1}{6}\right)^n}$ لكل n من IN .
- 1 ج . احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين الثالث (9,5 ن)

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على IR بما يلي : $f(x) = x^2 - 2xe^x + 2e^x$ وليكن (C) تمثيلها المبياني في معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1 1. أ . احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- 1 ب . تحقق أن : $f(x) = x^2 \left(1 + 2(1-x) \frac{e^x}{x^2}\right)$ لكل x من IR^* .
- 2,5 ج . احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة.
- 1 2. أ . بين أن : $f'(x) = -2x(e^x - 1)$ لكل x من IR .
- 1,5 ب . بين أن الدالة f تناقصية قطعاً على IR .
- 3 . التمثيل المبياني التالي هو للمنحنى (C) الممثل للدالة f .



- 1,5 أ . باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن : $\int_0^1 xe^x dx = 1$.
- 1 ب . احسب A مساحة الحيز المستوي المخدش .

التمرين الرابع (4 ن)

يحتوي كيس على عشر (10) كرات غير قابلة للتمييز باللمس ، ثلاث (3) كرات تحمل الرقم 1 وثلاث (3) كرات تحمل الرقم 2 وثلاث (3) كرات تحمل الرقم 3 وكرة واحدة تحمل الرقم 4. نسحب تأنيا ثلاث كرات من الكيس.

1 . نعتبر المتغير العشوائي X الذي يساوي عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم 1.

أ . حدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X . 1

ب . حدد قانون احتمال المتغير العشوائي X . 2

2 . احسب احتمال الحدث : "سحب ثلاث كرات واحدة منها فقط تحمل الرقم 1 والكرتان المتبقيتان تحملان كل منهما رقما زوجيا". 1